

إلى صيد السمك في المسطحات المائية لأسماك الزندر العملاقة

منطقة صيد السمك لبيركالا (Pirkkala) [منطقة الثروة السمكية 2019 -] فيها مسطحات مائية مثيرة للاهتمام لممارسي مختلف أشكال صيد الصيد. من الممكن السعي للحصول على وارد السمك الكبير من مسارات المياه الواسعة لبحيرة بوهايارفي (Pyhäjärvi) ومن شواطئ الجداول الصخرية المتلاطمة ومن البحيرات الصغيرة المتعددة في المنطقة.



الصورة: إسمو كولاري (Ismo Kolari)

بحيرة بوهايارفي (Pyhäjärvi) - تتبع إلى مستودع - سمك الزندر

بحيرة بوهايارفي (Pyhäjärvi) التي تتراوح فيما بين البحيرة الرئيسية للمنطقة ليمبالا (Lempäälä) وتامبيره، هي عبارة عن مسطح مائي سمكي متعدد الأشكال، حيث أنها مكونة من ناحية جودة المياه ومن ناحية ثروتها السمكية من مناطق تختلف عن بعضها البعض. عادةً ما يكون ماء البحيرة متعكر بالطين وغني تقريباً بالنباتات. سمك الزندر يزدهر ويتكاثر بكثرة في بحيرة بوهايارفي (Pyhäjärvi)، حيث أنها وعلى مر العصور إحدى أفضل المسطحات المائية في البلاد لسمك الزندر. الأسماك كبيرة الحجم التي يبلغ وزنها العديد من الكيلوغرامات شائعة في بحيرة بوهايارفي (Pyhäjärvi)، وهناك الكثير من سمك الزندر العادي الذين يزن كيلو غرام. في السنوات الأخيرة تم اصطياد العديد من أسماك الزندر العملاقة التي يزيد وزنها عن 10 كيلوغرامات.

من الممكن اصطياد سمك الزندر من أي مكان في بحيرة بوهايارفي (Pyhäjärvi). أماكن سمك الزندر المعروفة هي المناطق المائية منخفضة العمق في تووتوسين (Touosen) لبحيرة ليمبالا (Lempäälä) وفي مياه فيسلاهنتي (Vesilahti) وكذلك الأجزاء العميقة الوسطية لسايانسيلكا - فاكالانسيلكا (Säijänselkä-Vakkalanselkä) وسورفانسيلكا (Sorvanselkä). من الممكن التقاط سمك الزندر من سافيسيلكا (Saviselkä) التي تقع أمام نوكنيا وبيركالا ومن التقاطع المائي للتدفق الغزير لكايافانتو (Kaivanto) الذي يقع في الناحية الجنوبية لها. أماكن التدفق الغزير للماء وأماكن التقاطعات المائية تعتبر بشكل عام أماكن جيدة لسمك الزندر. من الممكن اصطياد سمك الزندر من خلال إلقاء الجيغ (سمكة الطعم المعدنية) أو بالإلقاء العمودي للجيغ، أيضاً من المنحدرات الصخرية العميقة. في نهاية الصيف من الممكن اصطياد سمك الزندر من المناطق العميقة، من خلال خطافات الطعم التي توضع في مؤخرة القارب. على الرغم من وجود الكثير من سمك الزندر في البحيرة، فسمك الزندر المتحصل عليه من الصيد كان وما زال غزير جداً في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال أثناء الاصطياد الشتوي بالشباك، فإن سمك الزندر لبحيرة بوهايارفي (Pyhäjärvi) غالباً ما يكون متقلباً عند اصطياده بالطعم. أكل الطعم يتفاوت من يوم لآخر وغالباً ما يتوقع سمك الزندر في القاع، ولا يمكن التقاطه. الحصول على سمكة زندر عملاقة يتطلب المهارة والمعرفة والكثير من المحاولات وغالباً إلى الحظ أيضاً. ألوان السمك المعدني كطعم المفضل تجريبها في بحيرة بوهايارفي (Pyhäjärvi) هي ألوان منها الملون كالبيغاء واللون المائل للون السمك والألوان الطبيعية.



الصورة: إسمو كولاري (Ismo Kolari)

المناطق المحمية تؤمن تجدد أعداد سمك الزنדר لتأمين تكاثر سمك الزنדר فإنه توجد
منطقتين محميتين في بوهايارفي (Pyhäjärvi)، حيث أنه يُمنع فيهما جميع أنواع صيد السمك،
ما عدا اصطياد سمك الهفت بالمغرفة الشبكية. فترة الحماية لتدفق الغزير للماء لهاهكالانفوولي
(Hahkalanvuolle) لبحيرة ليمبالا (Lempäälä) هي خلال الفترة 1/1 - 6/15 وفي محيط
لوودونساري (Luodonsaari) لنوكيا خلال الفترة 5/1 - 6/15.

الطول الأدنى لسمكة الزنדר 42 سم.

من أمام تامبيره سمك السلمون المرقط وسمك التروته القزحية بالإضافة إلى سمك الزنדר.

الجزء الشمالي لبحيرة بوهايارفي (Pyhäjärvi) يختلف في نوعية جودة مياهه عن المناطق الأخرى. بوهايارفي (Pyhäjärvi) تحصل من بحيرة ناسييارفي (Näsijärvi) ومن خلال تاميركوسكي (Tammerkoski) على مياه عكرة تميل قليلاً إلى اللون البني ولكنها تعتبر مياه صافية تقريباً. تقع في المنطقة المناطق الأكثر عمقاً لبحيرة بوهايارفي (Pyhäjärvi)، حيث يكون عمق المياه فيها نحو 40 متراً. ندعم كميات السمك الطبيعية من خلال الزراعة الغزيرة لسمك السلمون المرقط الذي يعيش في البحيرات وسمك التروته القزحية والسمك الأبيض (كورجون أوروبي). كما تتم زراعة الأسماك الشعبانية (أنقليس أوروبي أو أنقليس مألوف) وسمك الكراكي.

الصيادون بالرمي لبحيرة بوهايارفي (Pyhäjärvi) من جهة تامبيره لديهم إمكانيات جيدة في الحصول وهم في جهة الشاطئ على سمك التروته القزحية السمين والمنتعش أو على سمك السلمون المرقط الذي يعيش في البحيرات ذو الزعنفة الصغيرة القريبة من الذيل المقطوعة. جميع أسماك السلمون المرقط التي تتم زراعتها، تُقطع منها الزعنفة الصغيرة التي تقع في جهة الظهر بالقرب من ذيل السمكة، كي يكون من الممكن تمييز السمك الذي تمت زراعته عن سمك السلمون المرقط المولود في الطبيعة.



الصورة: إسمو كولاري (Ismo Kolari)

الطول الأدنى لسمك السلمون المرقط الذي يعيش في البحيرات الذي تم قطع زعانفه الصغيرة القريبة من الذيل هو 50 سم، في الناحية الشمالية لبحيرة بوهايارفي (Pyhäjärvi) شرق راياسلمي (Rajasalmi) وفي تاميركوسكي (Tammerkoski) في الناحية السفلى لشلال توليد الطاقة العلوي. في المسطحات المائية الأخرى فإن الطول الأدنى لسمك السلمون المرقط الذي تم قطع زعانفه الصغيرة القريبة من الذيل هو 50 سم.

عندما تصطاد سمكة طولها أدنى من الحد المطلوب، فقم بالتعامل معها بلطف عندما تفصلها عن الخفاف. **لاحظ! كل أسماك السلمون المرقط التي لديها زعنفة قصيرة جهة الظهر بالقرب من الذيل تعتبر محمية بغض النظر عن حجمها. فيتوجب إطلاقها فوراً وإرجاعها إلى المياه التي تم اصطيادها منها.**

الطول الأدنى لسمكة التيمالوس 35 سم.

الأصناف الشائعة التي من الممكن الحصول عليها من بحيرة بوهايارفي (Pyhäjärvi) هي سمك الكراكي وسمك الفرخ الأوروبي وسمك البربوط ومختلف أسماك فصيلة الشبوطيات كسمك الأبراميس وسمك الزؤش. سمك الفرخ الأوروبي الذي يحال جيد من الممكن اصطياده من خلال الجيغة (سمكة الطعم المعدنية) من على الصخور الصاعدة إلى أعلى سطح الماء أو من مكان التدفق الغزير للماء. في فصل الشتاء يُفضل صيد سمك الفرخ الأوروبي من خلال طعم السمكة المعدنية المتوازن والقائم على بُعد بضعة أمتار من المياه المنخفضة. أعداد سمك الكراكي قليلة في مياه منطقة تامبيره ولكنها تتحسن في المسار المائي تجاه ليمبالا (Lempäälä). التقنين يضر بتكاثر سمك الكراكي ونأمل بأن يحدث تحسن على هذا الوضع في المستقبل. كما أنه توجد في بحيرة بوهايارفي (Pyhäjärvi) أعداد نادرة وسريعة النمو من سمك الفئداس، حيث أنه من الممكن اصطياده بشباك 18 - 25 مم.

كانت قد تمت من قبل زراعة سمك الزندر في بحيرة بوهايارفي (Pyhäjärvi) كزراعة إلزامية، ولكن تم إنهاء هذه الفعالية في مطلع الألفية الحالية. لم يتم إثبات بأن الزراعة تزيد القدر الذي يتم اصطياده. من الواضح أن أسماك الزندر للجزء الشمالي من بحيرة بوهايارفي (Pyhäjärvi) في المياه الأكثر عكراً وبرودة تنمو بقدر أبطأ وهي أنحف من أسماك الزندر لسورفانسيلكا (Sorvanselkä). كما أنها تبلغ سن التناسل وهي أكبر سنّاً.

جمبري جراد البحر من على الصخر بطعم سمك الزؤش

يوجد في بوهايارفي (Pyhäjärvi) جمبري جراد البحر، حيث أنه يتم اصطياده بالسلال الشبكية على بعد بضعة أمتار من عمق قاع الصخر. لقد تحسنت الكميات التي تم اصطيادها في الفترة الأخيرة من الأجزاء الجنوبية والوسطى للبحيرة. كميات جمبري جراد البحر الجيدة الموجودة أمام تامبيره قد انهارت مؤخراً، ولم تنتعش بعد. يتم استيضاح سبب ذلك. تمت ملاحظة وجود مرض يصيب ذيل وارجل جمبري جراد البحر، ومن الممكن أن يكون هو السبب في تراجع اعدادها.



الصورة: إسمو كولاري (Markku Rekola)

بحيرة بوهايارفي (Pyhäjärvi) التي تعتبر البحيرة الرئيسية لمنطقة المسطحات المائية لنهر كوكيمافي (Kokemäenjoki) فيها تدفقات قوية للماء، حيث أن كمية الماء الكلية للبحيرة تتغير بسرعة. في فصل الشتاء فإن أماكن تدفق الماء تتجمد بطبقات رقيقة، والجليد المتحمل للثقل لا يوجد على كل حال في كل مكان، على سبيل المثال في أماكن منها أماكن التدفق القوي للماء وأماكن التقاطعات المائية وفي مساحات واسعة أسفلها. من المفضل السير على الجليد فقط في تلك المناطق الموجود فيها بشكل مؤكد ثلج سميك.



الصورة: إسمو كولاري (Ismo Kolari)

من البحيرات الصغرى سمك الفرخ الأوروبي وسمك الكراكي وسمك الأبييض (كورجون أوروبي) وسمك التروثة القرزية وسمك الشبوط ...

توجد في منطقة اصطياد السمك لبيركالا (Pirkkala) تشكيلة واسعة من البحيرات متوسطة الحجم والصغيرة كوجهات لرحلات صيد السمك. في البحيرات الصغرى من الممكن الحصول على السمك بسهولة بإلقاء صنارة البكرة أو بالصيد بالصنارة العادية من الشاطئ وكذلك في الشتاء بالصنارة من خلال الثقب في الجليد. اصطياد السمك من على الشاطئ ممكناً أيضاً في البحيرات متوسطة الحجم، ولكن من الممكن فيها العثور على أماكن لصيد السمك على نطاق أوسع من خلال القارب أو قارب الكانو.

سمك الكراكي وسمك الفرخ الأوروبي وأسماك فصيلة الشبوطيات هي عبارة عن الأسماك النموذجية التي من الممكن اصطيادها من جميع البحيرات الصغيرة. تتم زراعة سمك التروثة القرزية في البحيرات القريبة من تامبيره في بحيرة أهفينيسيارفي (Ahvenisjärvi) وكاوكايارفي (Kaukajärvi) وبيلتولامبي (Peltolampi) وتيسومايارفي (Tesomajärvi) وتوهلوبي (Tohloppi) وفاكولامبي (Vaakkolampi). من الممكن الحصول على السمك الأبييض (كورجون أوروبي) من عدة أماكن منها المسطحات المائية الصافية لبحيرة هيرفانتايارفي (Hervantajärvi) ومن ساركيبايفي (Särkijärvi) ومن كاوكايارفي (Kaukajärvi). الأخيرة التي تم ذكرها مازالت حتى العقد 1970 هي المعروفة كأكبرها من ناحية الوزن بالكيلوجرام لسمك الفرخ الأوروبي فيها. السمك الأبييض (كورجون أوروبي) موجود بكميات متفاوتة في العديد من المسطحات المائية الصغيرة في كل المنطقة المخصصة لصيد السمك، ومن الممكن تجريب صيدها بصنارة الفراشة أو بسمكة الطعام المعدنية الصغيرة وفي الشتاء بسمكة الطعام المعدنية على شكل الملعة. توجد في بحيرة سونويارفي (Suonojärvi) في فيسلاهي (Vesilahti) أسماك الزندر بكميات جيدة.

من الممكن اصطياد سمك الشبوط وسمك التنش من باهالامبي (Pahalampi)، حيث أنها منطقة خاصة تقع في نيكالا (Nekala) في تامبيره. يتوجب على الشخص لذلك المكان أن يحصل على رخصة للصيد خاصة به ثمنها 10 يورو (سنة 2017) [أنظر تراخيص اصطياد السمك] باهالامبي (Pahalampi) لديها كالأماكن الأخرى تشريعاتها الخاصة بها، والتي من المفضل الاطلاع عليها قبل البدء في اصطياد السمك.

الخيار الجيد هو الذهاب في رحلة إلى الطبيعة لبحيرة في الغابات مع صنارة البكرة وحقيبة الطعم ومع الطعام الشخصي. على سبيل المثال توجد على طول مسار بيرفيتا (Birgitanpolku) للبيمبالا (Lempäälä) العديد من البحيرات الصغيرة، حيث أنه من الممكن للشخص أن يجرب حظه معها ويستمتع بالطبيعة والسكون. توجد إرشادات توجيهية في المنطقة وأماكن للإيواء مخصصة للاستراحات. توجد أيضاً بحيرات صغيرة مثيرة للاهتمام في نواحي نوكنيا وبيركالا وفيسلاهي. من الممكن التحقق من على الخريطة من أماكن ومسارات رحلات صيد السمك المناسبة.



الصورة: إسمو كولاري (Ismo Kolari)

تاميركوسكي (Tammerkoski) الحضري وكووكالان-هيرالانكوسكي (Kuokkalan-Herralankoski) الخضراء

أماكن الجداول الصخرية توفر ساحة جيدة لصيادي أسماك السلمون من خلال صنارة الفراشة أو الرمي. نهر تاميركوسكي (Tammerkoski) الذي يتدفق عبر مركز مدينة تامبيره من الممكن اصطياد منه سمك التروتة القزحية وسمك السلمون المرقط. حيث أنه يتم اصطيادها بصنارة الفراشة وينصب صنارة الفراشة من خلال الثقل السفلي (spinfluga) وبالمغرفة وبالسمك المعدني المستخدم كطعم. يزداد السمك الأبيض (كورجون أوروبي) في نهاية الخريف في منطقة اصطياد السمك من خلال الفراشة في كيهارساري (Kehräsäari)، حيث أن صنارة الفراشة الصغيرة من الممكن أن تصطاد. كاصطياد عشوائي من نهر تاميركوسكي (Tammerkoski) يوجد أيضاً سمك السلمون الذي يعيش في البحيرات، حيث أنه أحياناً يعبر من ناسييارفي (Näsijärvi) إلى النهر، حيث أنه يتدفق قدر أكبر على كل حال من سمك السلمون المرقط الذي يعيش في البحيرات، والأسماك الكبرى منها يزيد وزنها عن عدة كيلوجرامات.

أماكن صيد السمك المفضلة بالقدر الأعظم في بيركانما هي كووكالا (Kuokkala) و هيرالانكوسكي (Herralankoski) في ليمبالا (Lempäälä). سمك التروتة القزحية وسمك الشبوط وسمك الزندر والتيمالوس وسمك السلمون المرقط وسمك الكراكي وكذلك كأصناف نادرة بقدر أكبر الأسماك الثعبانية (أنقليس أوروبي أو أنقليس مألوف) هي من ضمن التشكيلية التي من الممكن اصطيادها من منطقة الجدول الصخري. أسماك الشبوط الأكبر حجماً وزنها يزيد عن 6 كيلو غرامات. عند التقاط تلك السمكة فإن الفرامل تهتز والبكرة تميل بشدة! أنظر:

<https://www.kuokkalankosket.fi/>

ملاحظة! في أماكن الجدول الصخري فإن الصيد بصنارة الدودة ومن خلال الثقب في الجليد ممنوعة بشكل كلي. في الضوابط والنظم الخاصة بالجدول الصخري تُذكر وسائل صيد السمك المسموح بها.

يتوجب بأن تكون تراخيص الصيد سليمة ثم الذهاب لصيد السمك.

مدفوعات رعاية صيد السمك الخاصة بالدولة

يتوجب على الشخص الذي يبلغ عمره 18 - 69 سنة والذي يريد أن يصطاد السمك بوسائل أخرى غير الصيد بصنارة بكرة واحدة وثقب في الجليد (مجانية، لا تحتاج إلى ترخيص)، أن يدفع مدفوعات رعاية صيد السمك الخاصة بالدولة. فهذا يجعل لدى الشخص الحق في استخدام البكرة لبكرة واحدة بدون ترخيص من مالك منطقة المسطح المائي في جميع أنحاء الدولة ماعدا مناطق التدفق ومناطق الجداول الصخرية للمسطحات المائية للسمك المتنقل [على سبيل المثال تاميركوسكي (Tammerkoski) وكووكالان-هيرالانكوسكي (Kuokkalan-Herralankoski)] والنواحي الخاصة مثل باهالامبي (Pahalampi). مدفوعات رعاية صيد السمك من الممكن دفعها من خلال الرابط eraluvat.fi أو من أكشاك (R-kioski).

ترخيص مالك منطقة المسطح المائي والترخيص المشترك لبوهايارفي (Pyhäjärvi)

لاصطياد السمك وجمبري جراد البحر بأشكال أخرى تكون هناك حاجة بالإضافة لذلك إلى ترخيص من مالك منطقة المسطح المائي أو من مالك آخر للحق في اصطياد السمك. من الممكن الحصول على تراخيص صيد السمك من تاميركوسكي (Tammerkoski) ومن كووكالا - هيرالانكوسكي (Kuokkalan-Herralankoski) ومن باهالامبي (Pahalampi) وكذلك على تشكيلة جيدة من أماكن اصطياد السمك المحلية وللبلديات المساهمة ولمصايد الأسماك والمصايد الشبكية وصيد جمبري جراد البحر لمدينة تامبيره، فإن التراخيص متاحة على متجر الإنترنت على الرابط: www.kalapassi.fi. على صفحات الإنترنت لمنطقة صيد السمك لبيركالا (Pirkkala) www.pirkkalankalatalousalue.fi على خريطة البلدية المساهمة تم عرض مناطق المسطحات المائية لصيد السمك وللبلديات المساهمة وكذلك أماكن التراخيص الأخرى مع بيانات بائع التراخيص.

في بوهايارفي (Pyhäjärvi) فإن مناطق صيد السمك الحرة لسمك الزندر وللأسماك الأخرى متاحة في منطقة الترخيص المشترك ذو النطاق الواسع الذي يتشكل من منطقة صيد السمك لبيركالا (Pirkkala)، حيث أن ذلك مبين في الخريطة المرفقة باللون الأزرق الغامق وباللون الزهري. لا توجد هناك تقييدات للعدد في الترخيص، ما عدا المنطقة ذات اللون الزهري كحد أقصى ثلاثة "3" مسموح بها (حبل الصنارة) / قارب. من الممكن شراء الترخيص المشترك لمدة سنة (سنة 2024 السعر 50 يورو + رسوم التسجيل) أو لمدة أسبوع (18 يورو + رسوم التسجيل) أو 3 أيام (10 يورو + رسوم التسجيل) من متجر الإنترنت: www.kalapassi.fi أو من نقاط البيع بالدفع النقدي (عدة أماكن منها نيبون فيرغو "Nippon Verkko" و كالاكأبو "Kalakaapu").



الصورة: إسمو كولاري (Ismo Kolari)

التزم بالضوابط والنظم واصطاد السمك بعد التمتع باصطياد السمك

يتوجب الالتزام بالتوجيهات المعطاة بشأن صيد السمك. نقوم في المنطقة بمراقبة اصطياد السمك وتدخل عند حدوث تجاوزات. عند اصطياد السمك يتوجب أن يكون الأمر في حدود المعقول، خاصة إذا كان السمك قد وقع في الشرك وكانت كمية الصيد جيدة. عندما تكون التراخيص سليمة وتعامل صياد السمك جيداً، فإن إله السمك أهتي (Ahti) يكون سعيد. منطقة اصطياد السمك لبيركالا (Pirkkala) تتمنى لجميع صيادي السمك رحلات وافرة لاصطياد السمك!


معلومات إضافية:

www.pirkkalankalatalousalue.fi

www.kalapassi.fi (بيع التراخيص)

منطقة اصطياد السمك لبيركالا (Pirkkala)

Lake Pyhäjärvi Combined licence area and special sites



Mapline. Base map: © MML 2017.